



Dr. Pet

Profiláctico

Terapéutico

Antiséptico

Germicida

Bactericida

Fungicida

Anti-protzoo

Viricida

Hecho por Veterinarios

Eficiente Anti-microbiano

Iodisil Solución

Yodo - Povidona

El Yodo se utiliza desde hace mucho tiempo en forma de TINTURA DE YODO y SOLUCION DE LUGOL para la desinfección de pequeñas heridas.

A pesar de su eficacia, su aplicación quedaba limitada por el hecho de que ambas formulaciones provocaban una serie de efectos secundarios indeseables.

Al principio de los años 50 se descubre la Yodo-Polivinil-Pirrolidona (Y-PVP), mejor conocida como Yodo - Povidona (Y-P). Sin embargo, su uso en el mercado veterinario ha sido y, en ocasiones, sigue siendo limitado debido a que la Tintura de Yodo y la Solución de Lugol son más económicas.

La Yodo – Povidona, utilizada para formular **Iodisil Solución**, pertenece al grupo de los iodóforos: es un complejo hidrosoluble de yodo elemental con polivinilpirrolidona que conserva el espectro antimicrobiano del yodo sin poseer su toxicidad ni sus desventajas tales como la propiedad de causar irritación y reacciones alérgicas, teñir y ejercer acción corrosiva sobre ciertos metales, y ser doloroso al entrar en contacto con la piel erosionada.



Efficiente Anti-microbiano
Iodisil Solución
 Yodo - Povidona (Y-P)

APLICACIONES: Iodisil Solución

puede ser utilizado para diversos fines, sin embargo su principal campo de aplicación se halla en el sector de la profilaxis.

1. PROFILAXIS

- a. Desinfección de piel y mucosas
- b. Desinfección del campo operatorio
- c. Desinfección de heridas quirúrgicas
- d. Desinfección de instrumental quirúrgico, sin producir corrosión

2. TERAPEUTICA

- a. Heridas infectadas y abscesos
- b. Heridas de decúbito
- c. Ulceras varicosas
- d. Piodermatitis
- e. Dermatomicosis
- f. Vaginitis



EFICIENCIA MICROBIOLÓGICA

ORGANISMOS	CEPAS (número)	Y-P (1 ppm)	TIEMPO DE CONTACTO (segundos)
<i>Staphylococcus aureus</i>	2	1000	15
	1	66.7	60
	1	1000	30
	1	1000	30
	85	1000	30
	6	100	180
	13	2500	60
<i>Proteus mirabilis</i>	4	1000	120
	7	2500	90
	2	2500	60
<i>Proteus vulgaris</i>	1	1000	60
	5	2500	90
<i>Escherichia coli</i>	3	1000	120
	1	1000	60
	1	1000	60
	9	1000	30
	5	2500	60
	2	1000	30
	2	200	120
	1	2500	60
<i>Enterobacter aerogenes</i>	3	1000	60
	1	3.75	10
<i>Enterobacter spp.</i>	2	2500	300
	2	200	60
<i>Streptococcus faecalis</i>	1	1000	60
	1	2500	60
<i>Streptococcus pyogenes</i>	2	1000	15
	2	2500	60
<i>Streptococcus hemolyticus</i>	2	1000	30
<i>Salmonella typhimurium</i>	2	1000	15
<i>Salmonella typhosa</i>	1	2500	60
<i>Salmonella tipo C-1</i>	2	2500	60
<i>Salmonella spp.</i>	2	2500	60
<i>Serratia marcescens</i>	1	200	120
	1	1000	60
<i>Serratia spp.</i>	4	2500	60
	2	1000	30
<i>Shigella sonni</i>	2	1000	15
<i>Pseudomona aeruginosa</i>	1	1000	900
	13	25	900
	2	2500	300
	2	500	60
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	1	500	60
<i>Diplococcus pneumoniae</i>	1	1000	60
	2	2500	60
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	1	2500	60
<i>Bacillus subtilis</i>	1	1000	30
<i>Clostridium tetani</i>	1	1000	30
<i>Clostridium septicum</i>	1	1000	30
<i>Bacillus subtilis, esporas</i>	2	10.000	2hr.
<i>Trichophyton rubrum</i>	1	1000	60
<i>Candida albicans</i>	1	3.75	10
	1	1000	120
	1	1000	60
	1	1000	30
	1	500	60
<i>Trichomonas vaginalis</i>	4	400	30
	1	1000	30
<i>Aspergillus flavus</i>	1	1000	30
<i>Aspergillus niger</i>	1	1000	30

Eficiente Anti-microbiano

Iodisil Solución

Yodo - Povidona

BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA



100 ml



4 LT

COMPOSICION: Yodo-polivinilpirrolidona 10,00 g (equivalentes a 1,00 g de yodo disponible); Vehículo, c.s.p. 100,00 ml

INDICACIONES: Antiséptico para piel y mucosas, desinfección del campo operatorio, tratamiento de heridas, abscesos, quemaduras, lesiones de decúbito, dermatomycosis, piodermatitis, pústulas y vaginitis.

MODO DE EMPLEO: Sin diluir, aplicar sobre heridas e infecciones cutáneas 2-3 veces al día y, para la preparación del campo operatorio, frotar una cantidad suficiente hasta teñir la piel. Para el lavado de la mucosa bucal diluir 5 ml en 200 ml de agua y como lavado vaginal diluir 5 ml en un litro de agua hervida. Número y frecuencia de las aplicaciones a criterio del Médico Veterinario.

CONTRAINDICACIONES: No usar simultáneamente con otros antisépticos y detergentes ni con productos que contengan mercurio.

ADVERTENCIAS: De presentarse dermatitis, eritema o cualquier otra reacción adversa, discontinuar el uso y consultar al Médico Veterinario. Mantener fuera del alcance de los niños.

CONSERVACION: Mantener los envases cerrados, en lugar fresco y al abrigo de la luz.



Dr. Pet

Consulte Siempre a Su Médico Veterinario

Fabricado y Distribuido por **LABORATORIO SILVESTRI C.A.** R.I.F.: J-30631924-7
Turmero, Estado Aragua, República Bolivariana de Venezuela.

Tel.: **0244-661.00.65** / Telefax: **0244-663.22.69**

E-mail: **silvestrimercadeo@cantv.net.**